


◎病害虫は早期の発見・適期の防除

◎病害虫の発生状況は「県防除所」ホームページアドレスへ

ホームページアドレス http://www.jpnn.ne.jp/kagoshima
☎099-296-6430

◎農薬の使用基準を守り飛散防止に努めましょう。



時期	6			7			8			9			10		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
稲の一生	田植期 有効分げつ期 穂肥 幼穂形成期 出穂期 登熟期間 米粒完成														
	成熟期 (青刈比率が10~15%の時期が刈り取り適期)														
水管理	浅水 かん水 かん水 かん水 かん水 かん水 かん水 かん水 かん水 かん水 かん水 かん水 かん水 かん水 かん水 かん水														
	落水 (刈り取り1週間前を目安)														
病害虫名	いもち病 ウンカ類 コブノメイガ 防人(さきもり)箱粒剤														
	葉いもち ウンカ類 いもち病 稲紋こじ病 いもち病 紋枯病 トビイロウンカ カメムシ類 カメイシロウンカ														
農薬名	ダブルカット粉3DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL														
	10a当りの散布量 1箱当り50g 3~4kg 3~4kg 3~4kg 3~4kg 3~4kg 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg														
病害虫名	いもち病 ウンカ類 コブノメイガ 防人(さきもり)箱粒剤														
	稲紋こじ病 いもち病 紋枯病 トビイロウンカ カメイシロウンカ カメイシロウンカ														
農薬名	スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL スタークル粉DL														
	10a当りの散布量 1箱当り50g 3~4kg 3kg 3~4kg 3~4kg 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg														

病害虫名	農薬名	10a当りの散布量
いもち病	コブノメイガ	1箱当り50g
いもち病, 紋枯病	スタークル粉DL	3~4kg
紋枯病, ウンカ類, カメムシ類	スタークル粉DL	3kg
稲こじ病	スタークル粉DL	3~4kg
いもち病, 紋枯病	スタークル粉DL	3~4kg
トビイロウンカ	スタークル粉DL	3kg
カメイシロウンカ	スタークル粉DL	3kg

標準的施肥例と品種別栽培の留意事項	特徴
ケイチク 100kg	鉄分の欠乏による秋落の防止、けい酸の補給による倒伏防止、増収・品質向上に役立つ。
ケイカル 100kg	茎や葉が丈夫になり病害虫、倒伏、冷害などに強くなります。葉の受光体制が良く、登熟歩合が向上します。
粒状輸入エンリッチ40 100kg	ヨリンとケイカル・鉄を4:6で配合しており、根腐れ(秋落)防止、倒伏軽減、施肥の省力化がはかれます。
鉄入り苦土重焼燐 20~40kg	鉄分を含んだりん酸肥料です。根の生育を促進し、秋落防止や鉄欠乏の予防に効果があります。
鉄入り土の恵み 40~60kg	ケイ酸・鉄分を含んでいますので、健全な根を作り、秋落・根腐れを防止します。
シリカサポート1号 20~40kg	高溶出のケイ酸により、倒伏軽減や受光体勢、登熟効果を高める効果が期待できます。

◎「売れる米づくり」は、生産プロ
フィール日誌の記帳から！

JA西部地域営農センター TEL.(0995)65-2041
JA中部地域営農センター TEL.(0995)64-9891
JA北部地域営農センター TEL.(0995)54-1778
JA東部地域営農センター TEL.(0995)49-8701
JA経済部 TEL.(0995)43-7310
県始良・伊佐地域振興局 TEL.(0995)63-8215

農薬をご購入の際は印鑑をご持参下さい。