

# カキの栽培・防除暦（平成31年（2019年）版）

月	旬	生育状況	管理作業	対象病害虫	基幹防除	100% 当たり 薬量	補完防除及び注意事項	散布日 散布量 記入欄
1		休眠期	せん定	◎切り口及び傷口のゆ合促進	トップジンMペースト 原液塗布 (せん定整枝時) ※ 1cm以上の切り口には必ず塗布する		※ せん定と併せて粗皮削り、り病枝の切除を行う	
2								
3	中	発芽前	防霜対策					
4	中下	新梢伸長期	晩霜対策 摘蕾	◎炭疽病, 落葉病	デランフロアブル 2,000倍	50cc	※ 炭疽病, 落葉病の初期防除を徹底する	月 日 日
5	上中 下	開花直前 落花期	芽かき	◎炭疽病, 灰色かび病 ◎カキノハタムシ, アザミウマ類, カイガラムシ類	ケッター水和剤 1,000倍 モスピラン顆粒水溶剤 4,000倍	100g 25g	※ 花がらをよく落とす	月 日 日
6	上 中	生理落果	排水対策  夏季せん定	◎炭疽病 ◎フジコナカイガラムシ, カキノハタムシ, イラガ類	ジマンダイセン水和剤 500倍 スミチオン水和剤40(収穫45日前まで) 1,000倍	200g 100g		月 日 日
7	上 中	摘果 灌水		◎炭疽病 ◎カイガラムシ類, カキノハタムシ, ハマキムシ類	ジマンダイセン水和剤 (収穫45日前まで) 500倍 オリオン水和剤40(収穫21日前まで) 1,000倍	200g 100g	※ 炭疽病罹病枝は放置すると、果実への発生が多くなるため、見つけ次第除去し、園外へ持ち出す	月 日 日
8	下	果実肥大期	台風対策	◎炭疽病, 落葉病	アミスター10フロアブル(収穫7日前まで) 1,000倍 ※台風後は炭疽病の発生が増加するので、必ず防除を行うとともに、カラムシ類の発生に注意する。	100cc	※ 土壌が乾燥したらかん水する ※ カラムシ類は8月以降に発生増加する ○カラムシ類 アクタラ顆粒水溶剤 2,000倍(3日前まで) スタークル顆粒水溶剤 2,000倍(前日まで)	月 日 日
9				◎炭疽病, 落葉病	オーソサイド水和剤80(7日前まで) 1,000倍	100g	収穫直前の多発時 アグロスリン水和剤 2,000倍(前日まで) モスピラン顆粒水溶剤 2,000倍(前日まで)	月 日 日
10		収穫期	秋肥 (早生・普通)	◎落葉病	デランフロアブル(収穫後) 2,000倍	50cc		月 日 日
11								
12		休眠期		◎カイガラムシ類	ハーベストオイル 50倍	2%	※ 落ち葉, せん定枝は園外に持ち出し処分する	月 日 日

注1) 生育期に乳剤を散布すると薬害がでやすいので、乳剤は使用しない  
注2) 平成31年2月13日現在の登録内容に基づき記載

## 【農薬一覧】

殺菌剤	系統名	成分名	農薬名	予防効果	治療効果	使用時期 日前まで	散布量 (リットル/10a)	農薬使用回数	成分使用回数	毒性	適用病害虫名										
											炭疽病	落葉病	うどんこ病	灰色かび病	カキノハタムシ	ハマキムシ類	カイガラムシ類	アザミウマ類	カメムシ類	イラガ類	
殺菌剤	有機硫黄	マンゼブ	ジマンダイセン水和剤	○		45	200 ~ 700	2	2	普	○	○									
	その他	ジチアノン	デランフロアブル	○		90	200 ~ 700	5	5	劇	○	○	○								
	ベンゾイミダゾール	チオファネートメチル	トップジンMペースト	-	-	剪定整枝時	原液	3	塗布3回以内	普	切り口及び傷口のゆ合促進										
	混合剤	①ジエトフェンカルブ, ②チオファネートメチル	ゲッター水和剤	○	○	7	200 ~ 700	3	①3 ②6	普	○	○		○							
	トキシアクリレート	アゾキシストロビン	アミスター10フロアブル	○	○	7	200 ~ 700	3	3	普	○	○	○								
	その他	キャプタン	オーソサイド水和剤80	○		7	200 ~ 700	5	5	普	○	○									
殺虫剤	有機リン	MEP	スミチオン水和剤40	-	-	45	200 ~ 700	3	3	普				○		フジコナ		○	○		
	カーバメート	アラニカルブ	オリオン水和剤40	-	-	21	200 ~ 700	1	1	劇				○	○	○	○			○	
	合成ピレスロイド	シベルメトリン	アグロスリン水和剤	-	-	前日	200 ~ 700	3	3	劇				○			○	○			
	ネオニコチノイド	チアメトキサム	アクタラ顆粒水溶剤	-	-	3	200 ~ 700	3	3	普				○		コナ類		○	○		
		ジノテフラン	スタークル顆粒水溶剤	-	-	前日	200 ~ 700	3	4	塗布1回 散布3回	普				○		コナ類		○	○	
	アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤	-	-	前日	200 ~ 700	3	3		劇				○			○	○			
天然殺虫剤	マシン油	ハーベストオイル	-	-	発芽前	200 ~ 700	-	-		普							○				

注) 農薬一覧 (カイガラムシ類) フジコナ: フジコナカイガラムシ, コナ類: コナカイガラムシ類

## 【施肥基準例】 みかん秋ライト(13-9-8)(15kg袋)またはみかん秋4号(10-8-6)(20kg袋)の場合 (10a当たり)

		生産量 1.0t	生産量 2.0t
春肥	(2月下旬)	1袋	2袋
	(10月下旬)	4袋	5袋
秋肥	(11月中旬)	2袋	3袋

農薬登録内容が変更されている場合があるので、  
農薬使用前には表示ラベルをしっかりと確認しましょう！

注) 早生種の初秋肥は収穫直後に施用する  
※ 堆肥は完熟堆肥で牛ふん堆肥の場合 2t/10a程度施用する

鹿児島県園芸振興協議会始良支部