

ギンナン栽培・防除暦（平成31年(2019年)版）

生産履歴の記載を行います

農薬散布時は飛散防止に努めましょう

| 月  | 旬   | 生育状況           | 管理作業                  | 対象病虫害        | 基幹防除(防除方法)             | 補完防除及び注意事項                                                              |
|----|-----|----------------|-----------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 上中下 | 休眠期            | 整枝・せん定<br>クスサン卵塊の捕殺   | クスサン         | 耕種的防除                  | 主幹や主枝の分岐点付近にあるクスサンの卵塊を捕殺する                                              |
| 2  | 上中下 |                |                       |              |                        |                                                                         |
| 3  | 上中下 |                | 春肥施用                  |              |                        |                                                                         |
| 4  | 上中下 | 発芽期<br>開花期     | 台芽かき取り<br>除草<br>※人工受粉 | コウモリガ        | 除草を徹底する                | ※(粗花粉2,000倍液で人工授粉)<br>コウモリガは下草を食害した後イチョウに移動するため、除草を徹底する                 |
| 5  | 上中下 | 生理落果期<br>果実肥大期 | 除草<br>摘果<br>※らせん剥皮    |              |                        | ※5月下旬～7月上旬にらせん剥皮する<br>直径8cm以上の主幹・主枝を1cm幅で1.5周程度らせん状に剥皮し、トップジンMペーストを塗布する |
| 6  | 上中下 | 新梢伸長停止期        | 夏肥施用                  | コウモリガ        | スミチオン乳剤(収穫60日前まで) 100倍 | 0.3～3 ㍓/樹 (樹幹散布)                                                        |
| 7  | 上中下 | ↑<br>硬核期<br>↓  |                       |              |                        |                                                                         |
| 8  | 上中下 | ↑              | 早期収穫                  |              |                        | ※高圧洗浄剥皮機を活用して早期収穫出荷を行う                                                  |
| 9  | 上中下 | ↓<br>収穫期       | 収穫・調整                 |              |                        | ・完熟果を収穫する<br>・果肉を取り除くために2～3日水に浸す                                        |
| 10 | 上中下 | ↓              | 収穫・調整<br>秋肥施用         |              |                        |                                                                         |
| 11 | 上中下 | 落葉期            | 堆肥施用                  |              |                        | ・牛ふん堆肥を10a当たり2t施用する<br>・酸度矯正が必要な場合は苦土石灰を施用する                            |
| 12 | 上中下 | 休眠期            | 整枝・せん定                | 切り口及び傷口のゆ合促進 | トップジンMペースト 原液 塗布       | ・樹冠内部に日光が当たるように内向枝や交差枝、下垂枝を除去する<br>・直径3cm以上の切り口に塗布する                    |

注)平成31年2月13日時点の登録内容に基づき記載

【農薬一覧】

| 農薬名        | 系統名           | 成分名        | 使用時期     | 方法   | 農薬使用回数(成分) | 毒性 | 適用病虫害名       |
|------------|---------------|------------|----------|------|------------|----|--------------|
| スミチオン乳剤    | 有機リン系殺虫剤      | MEP        | 収穫60日前まで | 樹幹散布 | 3回以内(3回以内) | 普  | コウモリガ        |
| トップジンMペースト | ベンゾイミダゾール系殺菌剤 | チオファネートメチル | 剪定整枝時    | 塗布   | 3回以内(3回以内) | 普  | 切り口及び傷口のゆ合促進 |

【施肥基準例】

(10a当たり)

|                    | 窒素施肥量 | 現地での基準例     |
|--------------------|-------|-------------|
| 春肥 (3月上旬)          | 2.5kg | 森林肥料 12.5kg |
| 夏肥 (6月上旬)          | 2.5kg | 森林肥料 12.5kg |
| 秋肥 (10月下旬)         | 6.0kg | 森林肥料 30.0kg |
| 有機物の投入(11月下～12月上旬) |       | 完熟牛ふん堆肥 2t  |

農薬登録内容が変更されている場合があるので、  
農薬使用の前には表示ラベルをしっかりと確認しましょう！

鹿児島県園芸振興協議会始良支部