

# クリの栽培・防除暦（令和3年版）

生産履歴の記帳を行いましゅう

農薬散布時は飛散防止に努めましゅう

月	旬	生育相	重点作業	対象病虫害	基幹防除	100% 当り 薬量	補完防除及び注意事項	散布量 散布日 記入欄
1		休眠期	整枝・せん定	胴枯病	罹病枝の除去		※ 整枝せん定時、親指大の切り口には トップジンMペースト(原液)を塗る	月 日 日
2	上		春肥	カイガラムシ類	石灰硫黄合剤 10倍	10%		
3	下	発芽期						
4		雌花分化期 新梢伸長期 (幼虫食入直前～ 食入初期)		コウモリガ キクイムシ類	サツチューコートSセット 15倍	6.6kg	※ 樹幹部へ散布又は塗布 樹幹処理は1回以内	月 日 日
5								
6	上 中 下	開花期	夏肥	クリタマハチ クリイガアブラムシ	マブリック水和剤20 2,000倍	50g	○アブラムシ類 アトマイヤー水和剤 1,000倍	月 日 日
7	上 中 下	雄花分化期 新梢停止 2次生理落果		実炭疽病	ベルコートフロアブル 1,000倍	100cc	○モモゴマダラメイガ、クリイガアブラムシ エルサン乳剤 1,000倍	月 日 日
8	上 中 下	果実肥大期 収穫始期(早生)		実炭疽病	ジマンダイセン水和剤 600倍	166g	※ 防除は収穫7日前まで ※ こまめに収穫し、落ちた果実は早 めに収穫する	月 日 日
9	下	収穫終期(中生)	秋肥					
10			10aの埋没 密植園の縮伐・間伐					
11	中	落葉期	土づくり					
12		休眠期						

※ 令和2年10月28日現在の登録内容に基づき記載

※ 農薬使用時期・使用回数等については別紙参照

施肥基準例 (10a当たり)

	肥料名	樹齢 5～6年	樹齢 7年以上
春肥(2月上旬)	くみあい尿素入り 果樹化成168号 (10-6-8)	2 袋	3 袋
夏肥(6月上旬)		1 袋	2 袋
秋肥(9月下旬)		2 袋	2 袋
土づくり(11月中旬)	完熟牛ふん堆肥	2 t	2 t
	苦土石灰	100kg	100kg
目標収量		200 kg	300 kg

農薬登録内容が変更されている場合があるので、  
農薬使用前には表示ラベルをしっかりと確認しま  
しょう！

鹿児島県園芸振興協議会始良支部