

令和7年版 カキ使用農薬一覧

農薬は使用上の注意書きをよく読んで使用しましょう！！

令和6年12月11日現在

鹿児島県園芸振興協議会始良支部

	系 統 名	成 分 名	農 薬 名	使 用 時 期 ----- 日前まで	散布量 (リットル /10a)	農薬使用回数		成 分 使 用 回 数 ----- 回以内	毒 性	適 用 病 害 虫 名										
						炭 疽 病	落 葉 病			う ど ん こ 病	灰 色 か び 病	カ キ ノ ヘ タ ム シ ガ	ハ マ キ ム シ 類	カ イ ガ ラ ム シ 類	ア ザ ミ ウ マ 類	カ メ ム シ 類	イ ラ ガ 類			
殺菌剤	有機硫黄	マンゼブ	ジマンダイセン水和剤	45	200 ~ 700	2	2		普	○	○									
	その他	ジチアノン	デランフロアブル	90	200 ~ 700	5	5		劇	○	○	○								
	ベンゾイミダゾール	チオファネートメチル	トップジンMペースト	剪定整枝時	原液	3	塗布3回以内		普	切り口及び傷口のゆ合促進										
	混合剤	①ジエトフェンカルブ、②チオファネートメチル	ゲ ッ タ ー 水 和 剤	7	200 ~ 700	3	①3	②6	普	○	○		○							
	ストロビルリン	アゾキシストロピン	アミスター10フロアブル	7	200 ~ 700	3	3		普	○	○	○								
	その他	キャプタン	オーソサイド水和剤80	7	200 ~ 700	5	5		普	○	○									
殺虫剤	有機リン	MEP	スミチオン水和剤40	30	200 ~ 700	3	3		普					○		フジコナ		○	○	
	カーバメート	アラニカルブ	オリオン水和剤40	21	200 ~ 700	1	1		劇					○	○	○	○		○	
	ピレスロイド	シペルメトリン	アグロスリン水和剤	前日	200 ~ 700	3	3		劇					○			○	○		
	ネオニコチノイド	チアトキサム	アクタラ顆粒水溶剤	3	200 ~ 700	3	3		普					○		コナ類		○	○	
		ジノテフラン	スタークル顆粒水溶剤	前日	200 ~ 700	3	4	塗布1回 散布3回	普					○		コナ類		○	○	
		アセタミプリド	モスピラン顆粒水溶剤	前日	200 ~ 700	3	3		劇					○		○	○	○		
天然物	マシン油	ハーベストオイル	発芽前	200 ~ 700	-	-		普								○				