

令和7年版 クリ使用農薬一覧

農薬は使用上の注意書きをよく読んで使用しましょう！！

令和6年12月11日現在

鹿児島県園芸振興協議会始良支部

農薬名	適用病害虫名	希釈倍数	散布液量	使用時期	使用回数	使用方法	成分を含む農薬の総使用回数
アタックオイル	カイガラムシ類	50倍	200～700リットル /10a	発芽前	—	散布	—
サッチューコート Sセット	カミキリムシ類	50倍	—	産卵時期 但し、収穫60日前まで	1回	樹幹部及び主枝に 散布又は塗布	MEPを含む：4回以内(樹 幹処理は1回以内)
	キクイムシ類	15倍	—	産卵時期 但し、収穫90日前まで			
	コウモリガ		—	幼虫食入期直前～幼虫食入 初期 但し、収穫90日前まで			
マブリック 水和剤20	クリイガアブラムシ	2000倍	200～700リットル /10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	フルバリネートを含む：2 回以内
	クリシギゾウムシ						
	クリタマバチ						
ベルコート フロアブル	実炭疽病	1000倍	200～700リットル /10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	イミノクタジンを含む：2 回以内
ジマンダイセン 水和剤	実炭疽病	600倍	200～700リットル /10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	マンゼブを含む：2回以 内
トップジンM ペースト	胴枯病	原液	—	病患部削り取り直後	3回以内	塗布	チオファネートメチルを 含む：7回以内(散布は4 回以内、塗布は3回以 内)
	切り口及び傷口の ゆ合促進			剪定整枝時、病患部削り取り 直後、及び病枝切除後			
アドマイヤー 水和剤	アブラムシ類	1000倍	200～700リットル /10a	収穫7日前まで 但し、 <u>露地栽 培については、発芽期から開 花期を除く</u>	3回以内	散布	イミダクロプリドを含む： 3回以内
モスピラン 顆粒水溶剤	アブラムシ類	4000倍	200～700リットル /10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	アセタミプリドを含む3回 以内(但し、樹幹注入は 1回以内)
	カイガラムシ類	4000倍					
	クリシギゾウムシ	2000～4000倍					
	クリミガ						
	モモノゴマダラノ メイガ	2000倍					