

令和7年版 モモ使用農薬一覧

農薬は使用上の注意書きをよく読んで使用しましょう！！

令和6年12月11日現在				鹿児島県園芸振興協議会始良支部				
農薬名	適用病害虫名	希釈倍数	散布液量	使用時期	使用回数	使用方法	成分を含む農薬の総使用回数	FRACコード (殺菌剤) IRACコード (殺虫剤)
トップジンM ペースト	切り口及び傷口のゆ合促進	原液	－	剪定整枝時、病患部削り 取り直後、及び病枝切除 後	3回以内	塗布	チオファネートメチルを含む：10回以内(塗 布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生 育期の散布は6回以内)	1
ムッシュ ボルドーDF	せん孔細菌病	500倍	200～700 リットル/10a	開花前まで	－	散布	－	M1
	縮葉病							
チオノック フロアブル	黒星病	500倍	200～700 リットル/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	チウラムを含む：5回以内	M3
	縮葉病							
	せん孔細菌病							
	灰星病							
ダントツ 水溶剤	アブラムシ類	2000～4000倍	200～700 リットル/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	クロチアニジンを含む：3回以内	4A
	カメムシ類							
	シンクイムシ類							
	モモハモグリガ							
	クビアカツヤカミキリ	2000倍						
	コガネムシ類							
デラン フロアブル	縮葉病	1000倍	200～700 リットル/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	ジチアノンを含む：4回以内	M9
	黒星病	600～1000倍						
	せん孔細菌病							
	灰星病	600倍						
	ホモブシス腐敗病							
オリオン 水和剤40	アブラムシ類	1000倍	200～700 リットル/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	アラニカルブを含む：2回以内	1A
	カイガラムシ類							
	シンクイムシ類							
	モモハモグリガ			成虫発生期 (収穫14日前まで)				
	ケムシ類							
	クビアカツヤカミキリ							
アンビル フロアブル	黒星病	1000倍	200～700 リットル/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	ヘキサコナゾールを含む：3回以内	3
	灰星病							
バリダシン 液剤5	せん孔細菌病	500倍	200～700 リットル/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	バリダマイシンを含む：4回以内	U18
アクタラ 顆粒水溶剤	モモハモグリガ	2000～3000倍	200～700 リットル/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	チアメキシサムを含む：3回以内	4A
	アブラムシ類	3000倍						
	カメムシ類	2000倍						
	シンクイムシ類							
	ミカンキイロアザミウマ							
	クビアカツヤカミキリ							
ファンタジスタ 顆粒水和剤	うどんこ病	3000倍	200～700 リットル/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	ピリベンカルブを含む：3回以内	11
	黒星病	3000倍～4000倍						
	灰星病							
	ホモブシス腐敗病							
サムコル フロアブル10	コスカシバ	5000倍	200～700 リットル/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	クロラントラニリブロールを含む：2回以内	28
	シンクイムシ類							
	ハマキムシ類							
	モモハモグリガ							
フルーツ セイバー	黒星病	1500～2000倍	200～700 リットル/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	ペンチオピラドを含む：3回以内	7
	灰星病							
	果実赤点病							
	うどんこ病							
ICボルドー 412	せん孔細菌病	30～50倍	200～700 リットル/10a	－	－	散布	－	M1
	縮葉病	30倍						
スプレー オイル	カイガラムシ類	25～50倍	200～700 リットル/10a	発芽前	－	散布	－	UNM
	ハダニ類							
	ハダニ類の越冬卵							
アミスター10 フロアブル	黒星病	1000倍	200～700 リットル/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	アゾキシストロビンを含む：3回以内	11
	灰星病							
	ホモブシス腐敗病							
	炭疽病							
スタークル 顆粒水溶剤	アブラムシ類	2000倍	200～700 リットル/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	ジノテフランを含む：3回以内	4A
	カメムシ類							
	シンクイムシ類							
	モモチョッキリゾウムシ							
	モモハモグリガ							
スターナ 水和剤	せん孔細菌病	1000倍	200～700 リットル/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	オキシソニック酸を含む：3回以内	31
ラビキラー 乳剤	コスカシバ	200倍	200～350 リットル/10a	落葉後～発芽前(休眠期)	1回	樹幹及び主 枝に十分散 布する。	MEPを含む：6回以内(樹幹処理は1回以内) PAPを含む：1回	1B, 1B