

令和3年産 モモ使用農薬一覧

農薬は使用上の注意書きをよく読んで使用しましょう！！

令和2年10月28日現在

鹿児島県園芸振興協議会始良支部

農薬名	作物名	適用病害虫名	希釈倍数	散布液量	使用時期	使用回数	使用方法	成分を含む農薬の総使用回数
トップジンM ペースト	もも	切り口及び傷口のゆ合促進	原液	—	剪定整枝時、病患部削り取り直後、及び病枝切除後	3回以内	塗布	チオファネートメチルを含む：10回以内 (塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内)
石灰硫黄 合剤	もも	黒星病	7倍	—	発芽前	—	散布	—
		縮葉病						
		胴枯病						
落葉 果樹	もも	カイガラムシ類	7~10倍	—	発芽前	—	散布	—
		ハダニ類						
		越冬病害虫						
ムッシュ ボルドーDF	もも	せん孔細菌病 縮葉病	500倍	200~700 リットル/10a	開花前まで	—	散布	—
チオノック フロアブル	もも	黒星病	500倍	200~700 リットル/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	チウラムを含む：5回以内
		縮葉病						
		せん孔細菌病						
ダントツ 水溶剤	もも	アブラムシ類	2000~4000倍	200~700 リットル/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	クロチアニジンを含む：3回以内
		カメムシ類						
		シンクイムシ類						
		モモハモグリガ						
デラン フロアブル	もも	縮葉病	600~1000倍	200~700 リットル/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	ジチアノンを含む：4回以内
		黒星病						
		せん孔細菌病						
		灰星病						
スミチオン 乳剤	もも	アブラムシ類	1000~2000倍	200~700 リットル/10a	収穫3日前まで	6回以内	散布	MEPを含む：6回以内(樹幹処理は1回以内)
		ナシヒメシンクイ(心折防止)						
		モモハモグリガ						
		クワコナカイガラムシ						
		カメムシ類						
		クワシロカイガラムシ						
		ナシヒメシンクイ						
ハマキムシ類								
モモシンクイガ								
アンビル フロアブル	もも	黒星病	1000倍	200~700 リットル/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	ヘキサコナゾールを含む：3回以内
		灰星病						
バリダシン 液剤5	もも	せん孔細菌病	500倍	200~700 リットル/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	バリダマイシンを含む：4回以内
フルーツ セイバー	もも	黒星病	1500~2000倍	200~700 リットル/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	ペンチオピラドを含む：3回以内
		灰星病						
		果実赤点病						
		うどんこ病						
アクタラ 顆粒水溶剤	もも	モモハモグリガ	2000~3000倍	200~700 リットル/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	チアトキサムを含む：3回以内
		アブラムシ類	3000倍					
		カメムシ類	2000倍					
		シンクイムシ類						
		ミカンキイロアザミウマ						
		クビアカツヤカミキリ						
オンリーワン フロアブル	もも	うどんこ病	2000倍	200~700 リットル/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	テブコナゾールを含む：3回以内
		黒星病						
		炭疽病						
		灰星病						
		ホモプシス腐敗病						
オリオン 水和剤40	もも	アブラムシ類	1000倍	200~700 リットル/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	アラニカルブを含む：2回以内
		カイガラムシ類						
		シンクイムシ類						
		モモハモグリガ						
アミスター10 フロアブル	もも	黒星病	1000倍	200~700 リットル/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	アゾキシストロピンを含む：3回以内
		灰星病						
		ホモプシス腐敗病						
		炭疽病						
ICボルドー 412	もも	せん孔細菌病	30~50倍	200~700 リットル/10a	—	—	散布	—
		縮葉病	30倍					
スプレー オイル	もも	カイガラムシ類	25~50倍	200~700 リットル/10a	発芽前	—	散布	—
		ハダニ類						
		ハダニ類の越冬卵						
サムコル フロアブル10	もも	コスカシバ	5000倍	200~700 リットル/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	クロラントリニプロールを含む：2回以内
		シンクイムシ類						
		ハマキムシ類						
		モモハモグリガ						
スタークル 顆粒水溶剤	もも	アブラムシ類	2000倍	200~700 リットル/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	ジノテフランを含む：3回以内
		カメムシ類						
		シンクイムシ類						
		モモチョッキリゾウムシ						
		モモハモグリガ						
スターナ 水和剤	もも	せん孔細菌病	1000倍	200~700 リットル/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	オキシリニック酸を含む：3回以内
ラビキラー 乳剤	もも	コスカシバ	200倍	200~350 リットル/10a	落葉後~発芽前(休眠期)	1回	樹幹及び主枝に 十分散布する。	MEPを含む：6回以内(樹幹処理は1回以内) PAPを含む：1回