

令和3年産 クリ使用農薬一覧

農薬は使用上の注意書きをよく読んで使用しましょう！！

令和2年10月28日現在

鹿児島県園芸振興協議会始良支部

農薬名	作物名	適用病害虫名	希釈倍数	散布液量	使用時期	使用回数	使用方法	成分を含む農薬の総使用回数
石灰硫黄合剤	くり	芽枯病	20～40倍	—	発芽前	—	散布	—
	落葉果樹	カイガラムシ類	7～10倍					
		ハダニ類						
		越冬病害虫						
サッチューコート Sセット	くり	カミキリムシ類	50倍	—	産卵時期 但し、収穫60日前まで	1回	樹幹部及び主枝に 散布又は塗布	MEPを含む：4回以内(樹 幹処理は1回以内)
		キクイムシ類	15倍	—	産卵時期 但し、収穫90日前まで			
		コウモリガ		—	幼虫食入期直前～幼虫食入 初期 但し、収穫90日前まで			
マブリック 水和剤20	くり	クリイガアブラムシ	2000倍	—	収穫7日前まで	2回以内	散布	フルバリネートを含む：2 回以内
		クリシギゾウムシ						
		クリタマバチ						
ベルコート フロアブル	くり	実炭疽病	1000倍	200～700 リットル/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	イミノクタジンを含む：2 回以内
ジマンダイセン 水和剤	くり	実炭疽病	600倍		収穫7日前まで			マンゼブを含む：2回以 内
トップジンM ペースト	くり	胴枯病	原液	—	病患部削り取り直後	3回以内	塗布	チオファネートメチルを 含む：7回以内(散布は4 回以内、塗布は3回以 内)
		切り口及び傷口の ゆ合促進			剪定整枝時、病患部削り取り 直後、及び病枝切除後			
アドマイヤー 水和剤	くり	アブラムシ類	1000倍	200～700 リットル/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	イミダクロプリドを含む： 3回以内
エルサン乳剤	くり	カツラ マルカイガラムシ 若齢幼虫	1000倍		200～700 リットル/10a			収穫14日前まで
		クリイガアブラムシ						
		モモノゴマダラノ メイガ						