

系統名	成分名	IFRACコード (殺菌剤)	農薬名	予防効果	治療効果	使用時期 日前まで	散布量(ℓ/10a)	農薬使用回数	成分使用回数	毒性	適用病害虫名																			
											黒とう病	晩腐病	褐斑病	灰色かび病	うどんこ病	ベと病	アザミウマ類	チャノキイロアザミウマ	コガネムシ類	ブドウトラカミキリ	ハダニ類	アカガネサルハムシ	コウモリガ	カイガラムシ類	コナカイガラムシ類	クワコナカイガラムシ	ハマキムシ類			
殺菌剤	無機銅	塩基性硫酸銅	M1	ICボルドー48Q	○	-	200~700	-	-	普	*	*	*																	
			M1	ムッシュボルドーDF	○	-	200~700	-	-	普																				
	有機銅	有機銅	M1	キノンドーフロアブル	○		45日	200~700	4(開花後1)		普	○																		
			M3	ジマンダイセン水和剤	○		45日	200~700	2	2	普	○	○	○																
	ペンゾイミダゾール	チオファネートメチル	1	トップジンMペースト	-	-	剪定整枝時	-	3	5(塗布3)	普		○		切り口及び傷口のゆ合促進															
	SBI	テブコナゾール	3	オンリーワンフロアブル	○	○	前日	200~700	3	3	普	○	○	○	○	○														
		オキサホコナゾールフマル酸塩	3	オーシャインフロアブル	○	○	7日	200~700	2	2	普	○		○	○	○														
	酸アミド	ペンチオピラト	7	フルーツセイバー	○		7日	200~700	3	3	普	○	○	○	○	○														
		フェンヘキサミド	17	パスワード顆粒水和剤	○		14日	200~700	2	2	普				○															
		マンジプロパミド	40	レーバスフロアブル	○		7日	200~700	3	3	普											○								
	QoI	アゾキシストロビン	11	アミスター10フロアブル	○	○	30日	200~700	3	3	普	○	○	○	○															
	混合剤	①シプロジニル/②フルジオキシニル	9, 12	スイッチ顆粒水和剤	○	○	30日	200~700	2	①2 ②3	普		○		○															
	その他	イモクタジン酢酸塩	M7	ベフラン液剤25	○		休眠期	200~700	1	3(休眠期1)	劇	○	○	○	他病害でも登録はあるが、登録内容が異なる															
エタホキサム		22	エトフィンフロアブル	○	○	7日	200~700	4	4	普											○									
シアゾファミド		21	ランマンフロアブル	○	○	14日	200~700	3	3	普											○									
フルアジナム		29	フロンサイドSC	○		21日	50~100ℓ/樹	1	2(土壌灌注1)	普	白紋羽病:土壌灌注(他病害でも登録はあるが、登録内容が異なる)																			
殺菌植調剤	抗生物質	streptomycin	25	ストマイ液剤20	-	-	満開予定日14日前~開花始期	-	1	1	普	無種子化																		
殺虫剤	有機リン	MEP	1B	スミチオン水和剤40	-	-	大粒種21日 小粒種90日	200~700 200~700	2	4(収穫終了後から萌芽までは2、萌芽後は2)	普														○					
			1B	ガットサイドS	-	-	幼虫食入期直前~食入初期(21日)	-	2		普													○						
	合成ピレスロイド	フェンプロパトリン	3A	ロビンフード	-	-	前日	-	5	7(噴射は5、散布は2)	普													○						
	ネオニコチノイド	クロチアジン	4A	ダントツ水溶剤	-	-	前日	200~700	3	3	普							○	○	○	*			○						
		チアホキサム	4A	アクタラ顆粒水溶剤	-	-	7日	200~700	2	2	普							○	*	*	*			○						
	マクロライド	スピネラム	5	ディアナWDG	-	-	前日	200~700	2	2	普														○					
	殺ダニ	シエルパフェン	25A	スターマイトフロアブル	-	-	14日	200~700	1	1	普											○								
	ジアミド	シアントラニプロール	28	エクスレルSE	-	-	前日	200~700	3	3	普							○	○							*				
		クロラントラニプロール	28	サムコルフロアブル10	-	-	前日	200~700	3	3	普															○				
その他	ピリフルキサゾン	9B	コルト顆粒水和剤	-	-	前日	200~700	3	3	普							○							○						

<表の見方> ○・・・対象病害虫に登録があるもの *・・・適用病害虫としての登録はないが、○印の病害虫防除の際に効果がみられる病害虫。

注1) 農薬使用回数については、有効成分が同一のものがあるため、各成分の種類ごとの総使用回数が限度となる。

注2) 農薬の登録内容については、令和元年12月4日現在の登録内容に基づき記載。

適用病害虫名については、主な病害虫について記載した。その他については農薬のラベルを参照。

注3) 防除の際は、周辺の農作物に飛散をしないように散布し、同時に外部からの飛散にも注意する。

注4) 農薬使用時は農薬のラベルを熟読すること。