令和3年産　農薬一覧（ナシ）（令和2年10月28日現在）

農薬は使用上の注意書きをよく読んで使用しましょう!!

鹿児島県園芸振興協議会姶良支部

	系統名	成分名	IRACコード（殺虫剤）	FRACコード（殺菌剤）	農薬名	予防効果	治療効果	使用時期 日前まで	散布量（ℓ/10a）	農薬使用回数 回以内	成分使用回数 回以内		毒性	適用病害虫名 赤星病	黒星病	輪紋病	うどんこ病	胴枯病	ハダニ類	ニセナシサビダニ	シンクイムシ類	ハマキムシ類	アブラムシ類	カメムシ類	カイガラムシ類	コナカイガラムシ類	クワコナカイガラムシ	アザミウマ類	カミキリムシ類
殺菌剤	無機銅	塩基性硫酸銅	M1		Ｉ Ｃ ボ ル ド ー 48Q	○		収穫後～開花前	200 ～ 700	―	―		普		○													
	有機銅	①有機銅	M1		キノンドーフロアブル	○		3日	200 ～ 700	9	①12(塗布3，散布9)，②9		普		○	○												
	混合剤	①有機銅／②ｷｬﾌﾟﾀﾝ	M1・M4		オキシラン水和剤	○		3日	200 ～ 700	9			普		○	○												
	ﾍﾞﾝｿﾞｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ	ﾁｵﾌｧﾈｰﾄﾒﾁﾙ	1		トップジンＭペースト	―	―	剪定整枝時	―	3	11(塗布3)		普			○		○	切り口及び傷口のゆ合促進									
	SBI	ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ	3		アンビルフロアブル	○	○	7日	200 ～ 700	3	3		普	○	○	○	○											
		ﾌｪﾝﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	3		インダーフロアブル	○	○	7日	200 ～ 700	3	3		普	○	○	○	○											
		ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ	3		スコア顆粒水和剤	○	○	14日	200 ～ 700	3	3		普	○	○	○												
	酸ｱﾐﾄﾞ	ﾍﾟﾝﾁｵﾋﾟﾗﾄﾞ	7		フルーツセイバー	○		前日	200 ～ 700	3	3		普	○	○		○											
	ｱﾆﾘﾉﾋﾟﾘﾐｼﾞﾝ	ｼﾌﾟﾛｼﾞﾆﾙ	9		ユニックス顆粒水和剤47	○	○	21日	200 ～ 700	3	3		普		○													
	QoI殺菌剤	ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ	11		アミスター10フロアブル	○	○	前日	200 ～ 700	5	5		普		○	○	○											
		ﾏﾝﾃﾞｽﾄﾛﾋﾞﾝ	11		スクレアフロアブル	○	○	前日	200 ～ 700	3	3		普		○	○	○											
		ﾋﾟﾘﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	11		ファンタジスタ顆粒水和剤	○	○	前日	200 ～ 700	3	3		普		○	○												
	その他	ﾌﾙｱｼﾞﾅﾑ	29		フロンサイドSC	○		30日	50～100ﾘｯﾄﾙ／樹	1	2(土壌灌注1)		普	白紋羽病：土壌灌注（他病害でも登録はあるが，登録内容が異なる）														
		ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝｱﾙﾍﾞｼﾙ酸塩	M7		ベルクートフロアブル	○		14日	200 ～ 700	5	5		普		○	○	○											
		ｼﾞﾁｱﾉﾝ	M9		デランフロアブル	○		60日	200 ～ 700	4	5		劇	○	○	○												
殺虫剤	ｶｰﾊﾞﾒｰﾄ	ｱﾗﾆｶﾙﾌﾞ	1A		オリオン水和剤40	―	―	3日	200 ～ 700	2	2		劇								○	○	○		○		○		
		NAC	1A		ミクロデナポン水和剤85	―	―	60日	200 ～ 700	3	3		劇								○		○				○		
	合成ﾋﾟﾚｽﾛｲﾄﾞ	ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ	3A		アグロスリン水和剤	―	―	前日	200 ～ 700	3	3		劇								○	○	○	○					
		ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ	3A		ロディー水和剤	―	―	前日	200 ～ 700	2	7（噴射は5回，散布は2回以内）		劇								○	○	○	○					
		ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ	3A		ロビンフッド	―	―	前日	―	5			普															○
	ﾈｵﾆｺﾁﾉｲﾄﾞ	ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ	4A		アクタラ顆粒水溶剤	―	―	前日	200 ～ 700	3	3		普								○		○	○		○			
		ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	4A		スタークル顆粒水溶剤	―	―	前日	200 ～ 700	3	3		普								○		○	○		○			
		ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ	4A		モスピラン顆粒水溶剤	―	―	前日	200 ～ 700	3	3		劇								○		○	○	○				
	ﾏｸﾛﾗｲﾄﾞ	ﾐﾙﾍﾞﾒｸﾁﾝ	6		コロマイト水和剤	―	―	前日	400 ～ 700	1	1		普						○									
	殺ﾀﾞﾆ	ｼｴﾉﾋﾟﾗﾌｪﾝ	25A		スターマイトフロアブル	―	―	前日	200 ～ 700	1	1		普						○									
	ｼﾞｱﾐﾄﾞ	ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	28		サムコルフロアブル10	―	―	前日	200 ～ 700	3	3		普								○	○						
	天然物	ﾏｼﾝ油	NC		高度マシン95	―	―	―	―	―	―		普						○						○			
	その他	ｽﾙﾎｷｻﾌﾛﾙ	4C		トランスフォームフロアブル	―	―	前日	200 ～ 700	3	3		普										○		○			
		ﾋﾟﾘﾌﾙｷﾅｿﾞﾝ	9B		コルト顆粒水和剤	―	―	前日	200 ～ 700	3	3		普										○		○			
		ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ	21A		ハチハチフロアブル	―	―	30日	200 ～ 700	1	1		劇							○			○			○	○	

＜表の見方＞　○・・・・対象病害虫に登録があるもの　　＊・・・・適用病害虫としての登録はないが，○印の病害虫防除の際に効果がみられる病害虫。

注1）農薬使用回数については，有効成分が同一のものがあるため，各成分の種類ごとの総使用回数が限度となる。

注2）農薬の登録内容については，令和元年12月4日現在の登録内容に基づき記載。
　　適用病害虫名については，主な病害虫について記載した。その他については農薬のラベルを参照。

注3）防除の際は，周辺の農作物に飛散をしないように散布し，同時に外部からの飛散にも注意する。

注4）農薬使用時は農薬のラベルを熟読すること。