

ブルーベリーの栽培・防除暦（令和7年版）

鹿児島県園芸振興協議会始良支部（果樹部門）

月	旬	生育相	管理作業	対象病害虫	基幹防除	100g 当たり 薬量	補完防除及び注意事項	散布日・散布量 記入欄 （基幹防除）
					FRACコード(殺菌剤) IRACコード(殺虫剤)			
1	上 中 下	休眠期	整枝・せん定				※ 整枝・剪定は交差枝，弱小枝，下垂枝を 除去する	
2	上 中 下		基肥施用					
3	上 中 下	発芽期						
4	上 中 下	開花期 新梢伸長期		コガネムシ類幼虫	ダイアジノン粒剤5 1B 6kg/10a			月 日 リッ
5	上 中 下	果実肥大期	夏肥施用					
6	上 中 下	↑ (ハイベツシュ) ↓	収穫	イラガ類	コテツフロアブル 13 2,000倍	50g	※ 収穫は果梗部まで着色を確認し，早採り に注意する	月 日 リッ
7	上 中 下	収穫期					※ 土壌の乾燥防止のために敷きわら，敷き 草を行う	
8	上 中 下	(ラビットアイ)	灌水 礼肥施用				※ 乾燥が続く時は灌水を行う	
9	上 中 下		台風対策 灌水				※ 乾燥が続く時は灌水を行う	
10	上 中 下		秋肥(礼肥)					
11	上 中 下	落葉期						
12	上 中	休眠期		カイガラムシ類	ラビサンスプレー UN 30倍			月 日 リッ

注1)この防除暦は令和6年12月11日現在の登録内容を掲載したものです。
注2)農薬登録内容が変更されている場合があるので，**農薬使用前に表示ラベルを熟読してください。**

【農薬一覧】

農薬名	使用方法	使用時期	使用回数
ダイアジノン粒剤5	株元土壌混和	収穫14日前まで	2回以内
コテツフロアブル	散布	収穫前日まで	3回以内
ラビサンスプレー	散布	発芽前	－

【施肥基準例(成園)】

(10a当たり)

施肥時期		窒素施肥量
春肥(基肥)	2月下旬	4.0kg
夏肥	5月上旬	2.0kg
秋肥(お礼肥)	8月下旬	2.0kg

※ブルーベリーは酸性土壌(pH 4.5～5.0)を好むので，pHを高める資材の投入は気をつけましょう。

◎農薬の安全使用基準を遵守するとともに，生産履歴の記帳を行いましょう！ ◎農薬散布時は飛散防止に努めましょう！