

	系 統 名	成 分 名	I F R A C C o o d (殺 虫 剤 (殺 菌 剤))	農 薬 名	予 防 効 果	治 療 効 果	使 用 時 期 日前 まで	散布量(ℓ/10a)	農 薬 使 用 回 数 回以内	成 分 使 用 回 数		毒 性	適 用 病 害 虫 名															
										回以内	回以内		赤 星 病	黒 星 病	輪 紋 病	う ど ん こ 病	胴 枯 病	ハ ダ ニ 類	ニ セ ナ シ サ ビ ダ ニ	シ ン ク イ ム シ 類	ハ マ キ ム シ 類	ア ブ ラ ム シ 類	カ メ ム シ 類	カイ ガ ラ ム シ 類	コ ナ カイ ガ ラ ム シ 類	ク ワ コ ナ カイ ガ ラ ム シ	ア ザ ミ ウ マ 類	カ ミ キ リ ム シ 類
殺 菌 剤	無機殺菌	塩基性硫酸銅	M1	I C ボ ル ド ー 48Q	○		収穫後～開花前	200 ～ 700	—	—		普		○														
	有機銅	①有機銅	M1	キノンドーフロアブル	○		3日	200 ～ 700	9	①12(塗布3, 散布9), ②9		普		○	○													
	混合剤	①有機銅／②キャブタン	M1・M4	オ キ シ ラ ン 水 和 剤	○		3日	200 ～ 700	9			普		○	○													
	混合剤	①シフェノコナゾール②フルキサピロキサド	3,7	ア ク サ ー フ ロ ア ブ ル	○	○	14日	200～700	3	①3	②3	普	○	○	○	○												
	ベンゾイミダゾール	チオファネートメチル	1	ト ッ プ ジ ン M ペ ー ス ト	—	—	剪定整枝時	—	3	11(塗布3)		普			○		○	切り口及び傷口のゆ合促進										
	SBI	フェンブコナゾール	3	インダーフロアブル	○	○	7日	200 ～ 700	3	3		普	○	○	○	○												
	アズロピリミジン	シプロジニル	9	ユニックス顆粒水和剤 47	○	○	21日	200 ～ 700	3	3		普		○														
	QoI殺菌剤	マンデストロビン	11	ス ク レ ア フ ロ ア ブ ル	○	○	前日	200 ～ 700	3	3		普		○	○	○	○											
		ピリベンカルブ	11	ファンタジスタ顆粒水和剤	○	○	前日	200 ～ 700	3	3		普		○	○													
	その他	フルアジナム	29	フ ロ ン サ イ ド SC	○		30日	50～100ℓ／樹	1	2(土壌灌注1)		普	白紋羽病:土壌灌注(他病害でも登録はあるが、登録内容が異なる)															
		イノクタジナルベシル酸塩	M7	ベルコートフロアブル	○		14日	200 ～ 700	5	5		普		○	○	○												
		ジチアノ	M9	デ ラ ン フ ロ ア ブ ル	○		60日	200 ～ 700	4	5		劇	○	○	○													
インピルフルキサム		7	カ ナ メ フ ロ ア ブ ル	○		前日	200～700	3	3		劇	○	○	○														
イブフルフェノキン		52	ミギワ20フロアブル	○		前日	200～700	3	3		普		○		○													
TPN(テトラクロロイソフタロニトリル)		M5	パスポート顆粒水和剤	○		収穫後～落葉終了まで	200～700	3	3		普		○															
殺 虫 剤	カーバメート	アラニカルブ	1A	オ リ オ ン 水 和 剤 40	—	—	3日	200 ～ 700	2	2		劇								○	○	○		○				
		NAC	1A	ミクロデナポン水和剤 85	—	—	60日	200 ～ 700	3	3		劇								○		○				○		
	合成ピレスロイド	シペルメリン	3A	ア グ ロ ス リ ン 水 和 剤	—	—	前日	200 ～ 700	3	3		劇								○	○	○	○					
		フェンプロパトリン	3A	ロ デ ィ ー 水 和 剤	—	—	前日	200 ～ 700	2	7(噴射は5回、散布は2回以内)		劇								○	○	○	○					
		フェンプロパトリン	3A	ロ ビ ン フ ッ ド	—	—	前日	—	5			普																○
	ネオニコチノイド	チアトキサム	4A	ア ク タ ラ 顆 粒 水 溶 剤	—	—	前日	200 ～ 700	3	3		普								○		○	○		○			
		ジノテフラン	4A	ス タ ー ク ル 顆 粒 水 溶 剤	—	—	前日	200 ～ 700	3	3		普								○		○	○		○			
		アセタミプリト	4A	モスピラン顆粒水溶剤	—	—	前日	200 ～ 700	3	3		劇								○		○	○	○				
	マクロライド	ミルベメクチン	6	コ ロ マ イ ト 水 和 剤	—	—	前日	400 ～ 700	1	1		普							○	○								
	殺ダニ	シエノピラフェン	25A	ス タ ー マ イ ト フ ロ ア ブ ル	—	—	前日	200 ～ 700	1	1		普							○									
	ジアミド	クロラントラニリプロール	28	サ ム コ ル フ ロ ア ブ ル 10	—	—	前日	200 ～ 700	3	3		普								○	○							
	天然物	マシン油	UNM	高 度 マ シ ン 95	—	—	—	—	—	—		普							○				○					
	その他	スルホキサフロル	4C	トランスフォームフロアブル	—	—	前日	200 ～ 700	3	3		普									○		○					
ピリフルキサゾン		9B	コ ル ト 顆 粒 水 和 剤	—	—	前日	200 ～ 700	3	3		普									○		○						
トルフェンピラト		21A	ハ チ ハ チ フ ロ ア ブ ル	—	—	30日	200 ～ 700	1	1		劇							○			○			○	○			

＜表の見方＞ ○……対象病害虫に登録があるもの

注1) 農薬使用回数については、有効成分が同一のものがあるため、各成分の種類ごとの総使用回数が限度となる。

注2) 農薬の登録内容については、令和6年12月11日現在の登録内容に基づき記載。

適用病害虫名については、主な病害虫について記載した。その他については農薬のラベルを参照。

注3) 防除の際は、周辺の農作物に飛散をしないように散布し、同時に外部からの飛散にも注意する。

注4) 農薬使用時は農薬のラベルを熟読すること。